



●1回の押乳にかかる時間は約2時間。1時間で100頭ずつ、計200頭の牛から約3000ℓの生乳を搾ります。

兄弟家族の和が
喜びの旅館を生み出す
牛舎の中にいるなら、よく聞く圓転です。
牛ランチで牛の内臓、牛が牛から水分を奪う
いたいなら、ランチで牛の内臓を味めな
の筋肉も自動制御機器を利用して、効率
的な生活です。

への愛が溢れています



そんな小消耗した機能が出来たのは平成の被害のこと。冷害、害虫、それに共通によく見られる霜害を防ぐ手段として、安定期に取扱うのが最も一般的な霜害への対策です。霜害を防ぐためには、霜害の原因となる気温の低下を防ぐ方法と、発生した霜害に対する除霜の方法があります。しかし、霜害は必ずしも寒い季節だけではありません。春や秋でも、また夏でも、暖かい日でも、突然の寒波によって霜害が発生する場合があります。そのため、霜害に対する対策は、常に準備しておきたいところです。

A photograph showing a row of cows in a modern dairy farm barn. The cows are white with black spots and are standing behind a metal fence. They are eating hay from a trough. The barn has a high ceiling and a concrete floor.

北海道農業に限りない愛情を注ぎ、
たゆまぬ努力を続ける人々がいます。
農業の未来を創造する「北の農業人」の
情熱を取り組みをご組合します。

明日を語ろう!

IT CAN BE YOURS TO

「中標津町」

小沼 悟
代表取締役



法人化、機械化で高めてきた
乳質の良さが安定経営の力ギ。
「兄弟でカバーし合い、常に
ベストを尽くしてきたから今

A photograph showing a row of cows in a modern dairy farm. The cows are white with black spots. They are standing in stalls, facing a robotic milking machine. The machine has four arms that are currently attached to the cows' udders. The setting is a large, clean barn with metal beams and a checkered floor.