



灰色かび病、菌核病に効果を発揮。攻守に優れたミラクルアシスト！

「ファンタジスタ顆粒水和剤」

「ファンタジスタ顆粒水和剤」は、ピリベンカルブを有効成分とする新規の総合殺菌剤です。2002年よりKUF1204顆粒水和剤の試験を経て、(社)日本植物防疫協会を通じて委託試験を開始。ファンタジスタ研究会として、クミアイ化学工業(株)と日本曹達(株)で共同開発を進め、2012年8月20日、農薬登録を取得しました。

特長

- ① 広範囲な病原菌に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤で、特に灰色かび病、菌核病等に優れた効果を示します。
- ② 新しい構造を持った、新規有効成分を含有しています。
- ③ 予防活性に加えて、病斑伸展阻止効果治療活性を持っています。
- ④ 既存の各種耐性菌に対して効果を発揮します。
- ⑤ 各種作物への薬害発生リスクが少ない剤です。

多犯性の病原菌・灰色かび病菌





灰色かび病菌は豆類、たまねぎその他の作物、野菜類、花き類等を犯す多犯性の病原菌です。豆類の場合被害植物

菌の生活環のすべての場面で活躍するファンタジスタ

図1は本剤の作用特性を表した図です。また、図2はいんげん花弁上における灰色かび病菌に及ぼす影響を示した顕微鏡写真です。ファンタジスタ顆粒水

幅広い作物登録・病害登録
果樹・野菜等に広く登録を有します(表1)。あずき、いんげんまめの炭疽病にも登録を有します。

おわりに
本剤は、単一の新規有効成分を有し、広範囲な病原菌に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。特に灰色かび病、灰色腐敗病、菌核病、炭疽病に対して優れた効果を示し、各種作物への薬害発生リスクが少ない剤です。各作物のローテーション防除の一角を担う剤として、末永くご愛顧ください。



■表1 適用病害・使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	ピリベンカルブを含む農薬の使用回数
あずき	菌核病	2000倍	100~300/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内
	灰色かび病					
いんげんまめ	菌核病	2000倍	100~300/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内
	灰色かび病					
たまねぎ	灰色かび病	2000~4000倍	100~200/10a	収穫前日まで	5回以内	5回以内
	灰色腐敗病	2000~3000倍				

作物名	適用病害名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	ピリベンカルブを含む農薬の使用回数
だいず	菌核病	2000倍	100~300/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内
	炭疽病	2000~4000倍				
豆類 (種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、ちかかひを除く)	菌核病	2000倍	100~300/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内
	炭疽病	2000倍				
おうとう	炭疽病	3000倍	200~700/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内
	幼果腐核病					

※ファンタジスタはりんご、なし、ぶどう、なし、ネククリン、かんきつ、茶、きゅうり、トマト、ミニトマト、なす、いちご、キャベツ、レタス、青唐辛子にも登録があります。



●写真1 小豆灰色かび病

■日本曹達株式会社